

Tableau des facteurs d'exposition

Il ne faut pas oublier que souvent le facteur identifié n'est qu'un élément d'un ensemble et son importance est donc variable, il existe une interactions entre les différents facteurs de risques. Voici la liste des facteurs dont la carcinogénicité pour l'homme est établie

Tableau 1 : Liste des facteurs d'exposition et des cancers auxquels ils sont associés

| Facteurs d'exposition | Localisation |
|---|--|
| Aluminium | Poumon, vessie |
| Chrome (certains composés) | Poumon |
| Nickel | Sinus, poumon |
| Amiante | Plèvre, péritoine, poumons |
| Fonderie fer et acier | Poumon |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques | Peau, larynx, bouche, poumon, rein, vessie |
| Benzène | Leucémie |
| Arsenic | Peau, poumon, foie, vessie |
| Bis-chlorométhyle-éther | Poumon |
| Amines aromatiques | Vessie |
| Alcool (boisson) | O.R.L., oesophage, foie, sein |
| Caoutchouc (industrie) | Leucémie, vessie |
| Chlornaphazine | Vessie |
| Alcool isopropylique (fabrication) | Cavité nasale |
| Magenta (fabrication) | Vessie |
| Chlorure de vinyle | Foie |
| Aflatoxines | Foie |
| Chique bétel, tabac | Bouche |
| Tabac | Poumon, O.R.L. , oesophage, vessie, col. |
| Gaz moutarde | Poumon |
| Alkylants (chimio) | Vessie, leucémie |
| Immunosuppresseurs (aziatroprine) | Lymphomes, Kaposi, foie, peau |
| Contraceptifs oraux | Endomètre |
| Stéroïdes anabolisants | Foie |
| Oestrogènes | Endomètre, vagin (DES) |
| Poussière cuir | Leucémie |
| Poussière bois | Sinus |
| Radiations ionisantes | Leucémie, os, foie, sein, peau, thyroïde cerveau |
| Radon | Poumon |
| Ultraviolets | Peau |
| 8MOPP + U.V. | Peau |
| Hélicobacter pylori | Estomac |
| Schistosoma haematobium | Vessie |
| Opistorchis viverrini | Foie |
| Virus HBV, HCV | Foie |
| HPV | Col utérus |
| EBV | Lymphome, nasopharynx |
| HIV | Lymphome |
| HTLV | Leucémie |