

# TD7: Équations Différentielles Stochastiques

Geoffroy Hermann      Olivier Faugeras

2 Decembre 2009

Vous pouvez me poser vos questions par mail: [geoffroy.hermann@sophia.inria.fr](mailto:geoffroy.hermann@sophia.inria.fr)

**Exercice 1 : Résolution d'EDS non-linéaires** Résoudre les EDS suivantes (en expliquant pourquoi il existe une unique solution):

1. On s'intéresse à l'EDS non-linéaire:

$$\begin{cases} dX_t &= \sqrt{1 + X_t^2} dW_t + \left( \sqrt{1 + X_t^2} + \frac{X_t}{2} \right) dt \\ X_0 &= x \end{cases}$$

- (a) Ecrire l'EDS que vérifie le processus  $X_t = sh(W_t+t)$  où  $sh$  est le sinus hyperbolique  $sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ . On rappelle que  $sh' = ch$ ,  $ch' = sh$  et  $ch = \sqrt{1 + sh^2}$ .

- (b) En déduire la solution de l'EDS que l'on cherche.

2. Trouver la solution de l'EDS:

$$\begin{cases} dX_t = X_t^6 dt + \frac{1}{6}(X_t)^2 dW_t \\ X_0 = 0 \end{cases}$$

3. On considère l'EDS:

$$\begin{cases} dX_t = \frac{X_t}{2} dt + \sqrt{1 + X_t^2} dW_t \\ X_0 = x \end{cases}$$

La méthode que l'on va utiliser ici consiste à trouver une martingale et l'identifier pour résoudre l'équation. Cette méthode n'est pas générale pour résoudre les EDS. On note  $F(x) = \frac{x}{2}$  and  $G(x) = \sqrt{1 + x^2}$ .

- (a) Soit  $s$  une fonction  $C^2$ . Trouver une condition sur les dérivées de  $s$  pour que  $s(X_t)$  soit une martingale.
- (b) Trouver la fonction  $s$  telle que:

$$\frac{1}{2}G(x)^2 s''(x) + s'(x)F(x) = 0.$$

(On donne  $Argsh'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ )

- (c) En déduire l'équation de l'unique solution de l'équation.

**Exercice 2 : L'intégrale de Stratonovich** Soit  $(W_t)$  un mouvement brownien et  $X_1$  et  $X_2$  deux processus tels que:

$$\begin{cases} dX_1 = F_1 dt + G_1 dW_t \\ dX_2 = F_2 dt + G_2 dW_t \end{cases}$$

On définit l'intégrale de Stratonovich de  $X_1$  par rapport à  $X_2$  par la formule:

$$\int_0^t X_1(s) \circ dX_2(s) := \int_0^t X_1(s) dX_2(s) + \frac{1}{2} \int_0^t G_1(s) G_2(s) ds$$

1. Montrer en utilisant les formules démontrées dans le cours que pour tout  $t > 0$  et toute suite de subdivisions  $0 = t_0^n < t_1^n < \dots < t_{p_n}^n = t$  emboîtées de  $[0, t]$  dont le pas tend vers 0, on a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{p_n-1} \frac{W(t_{i+1}^n) + W(t_i^n)}{2} (W(t_{i+1}^n) - W(t_i^n)) = \int_0^t W(s) \circ dW(s)$$

dans  $\mathbb{L}^2([0, T])$ .

2. Montrer que si  $F : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$  est une fonction de classe  $C^3$  (trois fois continuellement dérivable) alors on a:

$$F(X_t) = F(X_0) + \int_0^t F'(X_s) \circ dX_s$$

### Exercice 3 : Premiers temps d'atteinte

1. Soit  $T_a$  le premier temps d'atteinte du Brownien à la constante  $a$ :

$$T_a := \inf\{t > 0, B_t = a\}$$

On admet que le temps d'atteinte  $T_a$  est presque sûrement fini. En utilisant le fait que  $e^{\theta B_t - \theta^2 t/2}$  est une martingale, montrer que la transformée de Laplace de  $T_a$  vérifie:  $\mathbb{E}(e^{-\lambda T_a}) = e^{-\sqrt{2\lambda}a} \forall \lambda \geq 0$ . Cette transformée de Laplace est la transformée de la Gaussienne inverse  $a^2/B_1^2$ , dont la densité vaut:

$$p(t) = \frac{|a|}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-a^2/2t}$$

### Exercice 4 : Le processus de Bessel

1. Soit  $W = (W^1, \dots, W^n)$  un mouvement Brownien de dimension  $n$ . On pose

$$R_t := \|W_t\| = \left( \sum_{i=1}^n (W_t^i)^2 \right)^{(1/2)}$$

Montrer que  $R$  satisfait l'équation différentielle stochastique:

$$dR_t = \sum_{i=1}^n \frac{W_t^i}{R_t} dW_t^i + \frac{n-1}{2R_t} dt$$

2. On suppose que  $n \geq 3$  et  $x_0 \in \mathbb{R}^3$  tel que  $R_1 < \|x_0\| < R_2$ . On considère le processus de Bessel partant de  $x_0$  (c'est à dire  $\|W + x_0\|$ ). Calculer explicitement la probabilité que  $R$  atteigne  $R_2$  avant d'atteindre  $R_1$ . Pour cela, on pourra étudier la fonction

$$\Phi(x) := \frac{1}{\|x\|^{n-2}}$$

On pourra montrer par exemple que  $\Delta\Phi = 0$

**Exercice 5 : Feynman Kac pour des frontieres dependant du temps**

Soit  $X$  la solution de l'EDS:

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t$$

et  $X_0 = x$ . Soit  $a(t)$  une courbe deterministe donnee et  $\tau_a$  le premier temps d'atteinte de  $X$  a la courbe  $a$ :

$$\tau_a := \inf\{t > 0 \mid X_t = a(t)\}$$

On veut caracteriser la transformee de Laplace de  $\tau_a$  qui s'crit  $u_\lambda(x) := \mathbb{E}(e^{-\lambda\tau_a})$  pour  $\lambda \geq 0$ . Soit  $v_\lambda$  la solution de l'EDP:

$$\begin{cases} \partial_t v_\lambda(t, x) + \mathcal{L}v_\lambda(t, x) - \lambda v_\lambda(t, x) = 0 \\ v_\lambda(t, a(t)) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} v_\lambda(t, x) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

où  $\mathcal{L}$  est l'opérateur différentiel:

$$\mathcal{L}f(x) := \frac{1}{2}\sigma(x)^2 \frac{d^2 f(x)}{dx^2} + b(x) \frac{df(x)}{dx}$$

1. Montrer que  $e^{-\lambda t} v_\lambda(t, X_t)$  est une martingale.
2. En deduire que  $u_\lambda(x) = v_\lambda(0, x)$ . (On supposera que  $\tau_a \leq K$  ps)